

szövetségünk Elnöksége már megtette az erre vonatkozó lépéseket.

Pósch Aladár gyógyszerész új gyógyszereket ismertet és mutat be a következőkben:

Két új jódpáraátum volna hivatva a kálium jodatum helyét a gyógyászatban elfoglalni több szakenber véleménye szerint, amennyiben az új jódpáraátumot, nevezetesen a jothion és sajodion alkalmazásával az eddig használt jódsók adagolásával fellépett u. n. jodismus teljességgel elkerülhető és az emésztő szervezetet sem irritálja. A jothion diiodhydroxpropán, sárgás olajsűrűségű folyadék, 2,5 fajsúlyu, circa 8% chemiailag lekötött jódot tartalmaz. Vizben 1:80, glicerinben 1:20, ol. sesamiban 1:2 arányban oldódik; alkohollal, aetherrel, chloroformmal minden arányban keverhető. Ezen szert a bőrre kenve használják, összetételénél fogva hamar felszívódik, úgy, hogy bekenés után 30 perczre a jódp a vizeletben már kimutatható volt. A bőrre kenve itt nem idéz elő kellemetlen tüneteket, a tapasztalatok szerint csakis túlérzékeny bőrön tapasztaltak némi átmenő égető érzést, ha tisztán és nem megfelelően higitott állapotban lett használva. Adagolást a 2—4 gr. naponta olajjal vagy lanolinum anhydricummal keverve kenőcs alakjában. A sajodin előnye a kal. jodatum felett ugyanaz, mint a jothioné. A sajodin egy zsírsavas monojodcalcium vegyület 26% jod tartalommal, íztelen, szagtalan, vízben teljesen oldhatatlan, fehér kristályos por. Adagja 1—4—6 gr.-ig naponta prodosi 1 gr. akár ostyába akár tisztán nyelvre szórva adható.

Acidol, mondható a sósav száraz alaku variatiója. A czukorrépa melasjából készült betainchlorhydrat. Fehér kristályos por, vízben könnyen, alkoholban nehezebben oldódik, levegőn nem változik. Íze kellemes gyümölcs-savakra emlékeztető, így sokkal könnyebben alkalmazható, mint a savanyusoknak maró ízű sósav. Öt csepp sósavnak $\frac{1}{2}$ gr., 8 cseppnek 1 gr. acidol felel meg. Felemlitendőnek tartom az acidol előnyét a higitott Cl. savval szemben pepsinnel való együttes rendelésénél. Több tapasztalat bizonyítja, hogy a pepsin big sósavval készített dragéei, pastillái már néhány hét lefolyása alatt gyógyhatásukból veszítettek, míg később az egészen el is tűnt, úgy, hogy az ilyen készítmény megbízhatósága teljességgel semmis; — még az acidollal készült hasonló pra-

parátumokban abszolút semmi értécsökkenés sem állott be.

Hetralin ez az urotropin derivátja, nevezetesen dioxybenzol hexametylen tetramin, azaz az urotropinnak egy-két vegyértékű phenollal való társulása. Előnye az urotropin felett az, hogy a hetralinból az oldott állapotban diszociált savanyu hatású phenol, az alkalicius urinban elősegíti az urotropinból a formaldehyd lehasadását. A hetralin hófehér tű alakú kristály, erősen édes ízű, levegőn nem változik, 160 C.^o-on bomlik fel. Víz 1:14 arányban oldja, borszeszben is oldható. Napi adagja 1.5—3.0—5.0, prodosi 0.5 3 óránként. Sok patientsnek feltűnő volt a praeparatum carból szaga és a nyelv hegyén kifejtett érzéktelenítő hatás, ezért tanácsos a szer por alakban való rendelésénél az ostyátokat használni.

Bemutatom a müncheni német drót-gyemspólyagyár által előállított pólyát; amelynek előnyeit úgy a gyár, mint a vele dolgozó sebész és gyakorló orvosok a következőkben állapítják meg: gyors és tetszetős, tiszta munka, a kötés könnyűsége, tartóssága, rugalmassága, jótékony befolyása a gyógyulásra. Ezek mellett a levétel éppen olyan munkával jár legfeljebb, mint a régigyeps kötésekénél. Súlyos esetekben az u. n. ablak-készítés is teljes könnyedséggel történhet. Mi nálunk a vám és szállítás elég drágává teszi, de ha csak dróthálót hozat az ember s az alabastrom gypset a kezelő orvos hinti rá, úgy sokkal olcsóbban szerezhető be. A pólya becsomagolt állapotban hideg vagy langyos vízbe mártandó be, mindaddig ott tartva, míg légbuborékok felszállnak, azután csekély nyomással a víztől megszabadítva alkalmazható, különös kemény kötések készítése céljából egy marék timsó oldandó fel a bemártásra használt vízben. A drót-pólya a kötés mellé sin gyanánt is felhasználható.

Pyrenol. Benzolthymilnatrium-benzoyloxybenzoicum, azaz: benzoe + salicyl-savas natriumnak thymollal való egyesítése. Fehér, hygroscopicus kristályos por, gyengén aromaticus szagu, édes ízű, vízben már 1:5 arányában oldódó praeparatum. Mint enyhe lázellenes, erős antirheumaticum, kitűnő és megbízható antineuralgicum; minden káros hatás nélküli szer lett ajánlva: asthma bronchiale és pertussisnál, mint specificum. Adagja az esetek különbözősége szerint 0.5—1.5 naponta 2—3-szor.

Elnök a közgyűlés nevében köszönetet mond az érdekes és tanulságos előadásért.

