

Előállításához a híres Hell-féle vegy-gyár által külön china-bor előállítására készített china-extractumát használtam és ferrum citric. am-ot. Ezt a gyógybort ezen extractum chinae pro vino chinae bemutatása végett hoztam fel. Az ily uton előállított china vas-bor óriási különbséget mutatott fel izre, gyógyhatásra nézve egyaránt más oly borokkal szemben, a melyek nem a china-kéreg ható anyagait tartalmazzák, hanem csak p o. chinin forr. citricum feloldásával készülnek.

Az előadónak értékes és tanulságos ismertetéseért és előadásáért a közgyűlés köszönetet mond.

Dr. Zehery István törvényszéki orvosi gyakorlatában sok orvosi szempontból érdekes és tanulságos esetek közül néhányat ismertett a következőkben:

Bonczolási lelet és vélemény N. N. F.-Zsaluzsányi lakos gondatlansággal vádolt emberölés vétségével bába bűnügyében.

Előzmény: X. nő V. para estefelé szülési fájdalmakat kapott s a szülésznő este 6 órakor megvizsgálta s jelentette, hogy itt igen rossz szülés lesz, olyan mint egy év előtt volt a faluban, (t. i. elhanyagolt harántfekvés, melyet műtéttel fejeztem be), de orvosért nem küld. A szülőnőnél később kifejlődik a harántul fekvő gyermek lehaladása a medenczébe s a bába ekkor (éjlél felé) orvos után javasol küldeni, de éjjel lévén, maga a férj sem iparkodik ezen.

Több tanu állítja, hogy később a bába több ízben benyult a csöbe s a férj állítása szerint egy ízben igen erősen fájta a behatolás a szülőnek, mert jajgatva kérte a szülésznőt, hogy hagyja abba műveletét. Éjféli után rövid időre (lehet, hogy azonnal) a bába említett behatolása után (mert a tanuvallomásból az időt megállapítani pontosan nem lehetett) a szülő nő hirtelen hátrahanyatlik és meghal.

A megejtett törvényszéki bonczolás teljes vérszegénységet állapít meg az összes szervekben.

A szabad hasüregben több mint $2\frac{1}{2}$ liter vér. A méhnek jobb oldalán a hüvelyboltozatra is kiterjedő s a méh alsó szakaszától fel a méh-test közepéig haladó repedés, mely az egész kezét kényelmesen befogadja, úgy hogy a repedésen át a kéz

a hüvelybe is bevihető. A magzat úgy, mint a méhlepény és burkok, a hátüregben a vékony belek között megtalálhatnak.

A magzat ép, erősen kifejllett s kiviselt leány.

A magzat testének egyik részén sem fedezhető fel az előlfekvő részre jellemző daganatnak nyomai sem. A törvényszéki szakértői vélemény szerint a méh-repedés a legnagyobb valószínűségi alapon úgy jött létre, hogy az összehuzódás állapotában levő méhen a még nyilván némi mozgathatóságot mutató elől fekvő rész eltolatása lett megkísérelve, s mivel az erre való kísérlet avatatlan kézzel, a kellő vigyázat és műfogás alkalmazása nélkül lett megejtve, ezen kísérlet közben, a megnyult méh alsó szakasza megrepedt s az anyának és magzatnak halála így okoztatott.

A véleményt indokolják a következők: 1. Tapasztalati tény, hogy spontán méh-repedés csak az előlfekvő részek által okozott akadálnak elhárítására törekvő erős méhösszehuzódások hosszú sorozata után áll be, s nem ritkán csak akkor, midőn nem csak órák — mind jelen esetben — hanem már napok teltenek el, midőn a méh a már u. n. tetanicus állapotba kerül; holott jelen esetben a méh-repedés oly hamar létre jött, hogy önkénytelenül is szembeötlő.

2. Önkéntes méh-repedés mindenesetre legalább is oly mérvű méhösszehuzódások után állhat be, mely mindenesetre az előlfekvő rész fejdagatának képződésére fog vezetni. Jelen esetben tehát az u. n. fejdagatnak hiánya mindenesetre bizonyítja azt, hogy az előlfekvő rész beékelődése nem volt hosszadalmas, nem volt erős, nem volt hosszú ideig tartó; tehát az önkéntes méh-repedést előidéző nagy összehuzódások és erőfeszítések még nem állhattak be, s ennek daczára a méh mégis megrepedt.

3. Tény s minden szülész tapasztalhatta mennyit bír el a méh haránt fekvések esetében. Tapasztalhattuk gyakran, hogy két napig is erőlködik a méh s még sem reped meg. Hogy az előlfekvő részek területük kétszeresére megdagadnak s fekete színűekké válnak; s tapasztalhattuk, hogy ily állapot mellett is — a kellő kantelák mellett — még fordítás is sikerül s a méh-repedés mégis kikerültetik.

4. A nő medenczéje nem mutatott semmi difformitást vagy csontkinövést, tehát e részről a méh repedésére ok nem volt jelen.

5. A nő szervezetében nem fordultak elő olyan beteges állapotok, melyek a méhizom szövetének különös szakadékonyságát indokolhatták volna.

6 Bizonyítva volt, hogy a nő a bába által olykép lett vizsgálva s oly módon ténykedett hüvelybe tolt kezével, hogy a szülő nő élénken jajgatott s a vizsgáló kezét eltávolítani igyekezett.

Ezek folytán a ren'elkezésemre álló tapasztalati adatok és a bonczolás adatai alapján nagy valószínűségi alapon véleményezhető, hogy a méhrepedés művi uton, az avatatlan bábának ténykedése által lett előidézve.

A főtárgyalás folyamán a vádbeli cselekményt a vádlott bába tagadja, de tagadását feltűnő lanyha módon végezi.

A törvényszék a vádbeszéd elhangzása után bebizonyítva találta a bába ténykedése által létre jött emberölést s N. N. bábát 2 havi börtönre, 200 korona pénzbüntetésre és szülésznői jogosultságának elvesztésére ítélte, megadva neki a jogot arra, hogy újabb vizsga letétele után a szülésznői jogosultságot magának újra megszerezhesse.

Vádlott nő az ítéletben megnyugodott, sőt a törvényszéki orvos iránt semmi neheztelést nem látszik mutatni, amennyiben annak tanácsadását a továbbiakra nézve is kikérte.

Az eset kapcsán élénk érdeklődés mellett folytatott eszmecsere támadt.

Dr. Ruber kérdést intéz az előadóhoz, vajjon a harántfekvés vagy karelőésés megállapítható volt-e? Dr. Zehery felvilágosít, hogy a kar előesése esetén azon elszinesedésnek okvetlenül volna nyoma. Ez pedig nem találtatott.

Dr. Löcherer szerint, ha a szülésznő megállapította a harántfekvést és orvosért küldött, nem lehet őt okozni, azt hogy kísérletet tett a kihúzásra, rábizonyítani nem lehet; mert hiszen vizsgálatot végezni köteles a bába s a környezet esetleg ezt is beavatkozásnak minősítheti. Nem lehetetlen, hogy a beilleszkedett vállat ujjal kitéríteni igyekezett; kérdés: lehet-e ez olyan erő, mely a méhet megrepeszti. Azt