

a terimenagyobbodás határai: felül az alsó állkapocs felső széle, mellül nyak közepe, alul a clavicula, hátul a gerincoszlop.

Diagn. Lymphoma malignum Therapia: Tekintettel a daganat abnormis nagyságára és csak korlátolt mozgathatóságára, el kellett tekintenünk az extirpációtól. Belsőleg guber vizet kap, a tumorba pedig Solut. arsen Fowleri injiciáltatik látható eredmény nélkül.

Dr. Löcherer Tamás egy hasonló esetre emlékszik. Rimaszombatban egy fiatal embernél látott hasonló lymphosarcomát a nyakon, melyet Kovács tanár nem akart operálni, aztán később Herczel bravurral operálta meg s a műtét után a beteg meglehetősen össze is szedte magát, $\frac{3}{4}$ év múlva azonban a daganat kiújult s a fiatalember csakhamar meghalt.

Dr. Ruber József, Alberti művére hivatkozva, azt mondja, hogy miután az ilyen lymphomák több mirigy-pamatból indulnak ki, biztos a kiújulás. A jelen esetben az operatív beavatkozást is igen veszedelmesnek tartja, mert a daganat alatt van a carotis, melynek ágai táplálják a daganatot. A prognózis tehát határozottan rossz.

A közgyűlés köszönetet mond az előadónak a beteg bemutatásáért.

Pösch Aladár bemutat új gyógy- és kötszereket, saját készítményeit és a Bulling-féle porlasztó készüléket. Ismertetése következő:

Tisztelt közgyűlés!

Mogbízatásomból kifolyólag néhány szóban az újabban bevált gyógyszerekről, néhány alkalmas új alakú kötszerről, és gyógyeszközközl fogok megemlékezni.

Thigenol. Synthesis útján előállított sulfosavas natrium, mely 10% lehűtött ként tartalmaz; az ichthyol helyetteseként tekinthető. Barna-fekete, sűrű, vízben, hig. alcoholban, glycerinben teljesen oldódik. Oldata gyengén alcalikus Ásványsavak és eczetsav hatására a sulfosav felhős csapadék alakjában leválik, a mely sikerrel kivonható; bepárolva 35% szá-

raz maradékot hagy vissza. Különösen bőrbajoknál u. m. ekzema, dermatitis, prurigo, scabies-nél használják mint viszketegséget csillapító, gyuladást enyhítő, antiparasiticus szert. Ily esetekben 20% vaselin kenőcsbe, s úgy zinc-amylum pastába keverve használják; mely alkalommal előnyei: szagtalan, nem tapadó hártyára szárad be a bőrön a mely vízzel lemosható, úgyszintén a fehérméből is kimosható. A gynäkologiában 10–15% thygenol-glicerinbe mártott tamponok segélyével alkalmazzák.

Bacillol. Lysolhoz hasonló kátrány lepárlási termék, a mely 52% Cresolt tartalmaz; barna sűrű, vízzel, 96 bor-szeszszel minden arányban tisztán oldódó folyadék. Nagyobb mésztartalmú víztől tej-szerű zavarodás áll be. Lacmus oldat irányában gyengén alcalicus; ezen vegy jelleg az előállításából következhetik valószínűleg, a mennyiben akresol szappan segélyével lett oldatba hozva, a mely szappan feles nátrium hydroxydot tartalmaz 1% oldata már desinfeiciensként hat, ezen oldatnak legtöbb bacillus már szoba hőmérsék mellett is legfeljebb 1–2 perczig áll ellent. Általában a lysolhoz áll a legközelébb, e felett annyiban van előnyben, hogy nem oly bűdös és hogy még olcsóbb. Creolin helyett fürdőkbe használják ujabban (104 viz 500.0 bacillol) az állat gyógyításban juhoknál rühösség esetében sikerrel, a mennyiben a gypjura semmi kártékony hatással nincs.

Mesotan. Salicylsav származék (Methoxymethylaether-salicyl,) Gyengén aromaticus, tiszta sárga olajszerű folyadék, viznél nagyobb fajsúlyú, ezzel nem keverhető, ellenben alcohol aether, chloroform és zsiros olajok bármily arányban oldja. Összetételénél és hatásánál fogva az oleum gaultheria procumbens helyettesének tekinthető, a melynél: hatás dolgában rheumaticus bántalmaknál megbízhatóbb, — alkalmazása pedig kellemesebb, mert nem bir ezen olaj kellemetlen szagával. Rendelni ol. sesamival egyenlő arány keverve szokták, napi 2–3 szori bedörzsölésre a midőn a mesotan felszívódik és a szervezetbe alkotó részeire bomlik fel. Ujabban egy berlini czég mesotán tapaszt hoz forgalomba

Anästesin. (Peraamido bensoesavas-aethylaether) Fehér iztelen por, a mely a nyelven érzést tompító hatást gyakorol. Viz nehezen; alcohol, aether, chloroform, olajok, zsírok könnyen oldja. Mint helyi érzéstelenítő az orthoform mellé helyezhető, a



cocaintól — különösen mélyrehatás tekintetében — messze áll. Belsőleg a gyomor hyperaesthesiájánál vagy ideges dyspepsiájánál 0.2—0.5 adagokban (leginkább alcáliákkal) naponta 3-szor adagolják, köhögési ingernél 0.2—0.4 pastillákban; vízzel hígított tragacant emulsióban inhalációknál 10% töménységben használják. Lanolinnal készült 5—10% dörzse, vagy 10% hintőpora „cocainol” néven kerül a forgalomba. Sósavas sója 1% és oldata sterilizálható, így subcután injectióra is alkalmas.

I c h t o f o r m. (Thyocarbürdisulfon formaldehyd.) Ichthyol disulfosavnak formaldehyddel való kapcsolódása ez. Fekete-barna íz és szag nélküli, a rendes oldószerekben oldhatatlan por. Hevítve elszenesedik, majd hamu hátrahagyásával elég. — A sebészetben mint a jodoform helyettesse tekinthető. Gyermekeknek 0.25—0.5, felnőtteknek 1—2 gr naponta 3—4-szer adható.

*

Egy újabb s tökéletesített belélgző készüléket, dr. Bulling összeállításában mutatok itt be. Ezen készülék főelvénye, hogy a fejlődött gazdag vizgözök direct a szájba vezetnek a kivezető nyílásból, — hőmérsékét egyszerű uton szabályozni lehet; az egész készülék könnyen és alaposan tisztítható nem rozsdál be, és végre az orr gözölésére is beállítható. Erős gözfejlesztő hépségénél fogva alkalmas a beteg szoba levegőjének gözpárával avagy szükség szerint valamely gyógyszerrel való telítésére is.

Az „aesculap” formalin lámpák: egyikét, az egyszerűbbet mutatom itt be. Midőn ezen lámpával valamely fertőzött helyiséget akarunk desinfectálni állatokat, élő növényeket innen eltávolítunk, a helyiség kivezető nyílásait részeit lehetőleg teljesen elzárjuk és vízpárával töltjük meg a szobát (100 m³-re 2—3 l. viz.) Ezután megkezdhetjük a lámpa meggyújtásával, a pastillák elhelyezésével a desinfectiót maximalis: 1 m³-re (2—2½ pastilla.) Ezen készülék maximalis fertőtlenítést véve 100 m³ helyiségre elegendő. A helyiség 7 óráig tartandó elzárva. A formalin gözök szagának ellensúlyozására ammoniát használunk. Butorok falak lemosására a 40% formalin oldat használható.

K ö t s z e r e k :

1. Tamponoknak használható steril, jodoform stb. gaze 2—10 cm. sz. —5 m h.

2. Bruns gyapot pólya alakban $7\frac{1}{2}$ cm — 30 cm. h.
3. Steril, jodoform stb. gázok czélszerű kettős tokban.
4. Condo gummi ujjak, vizsgálatokhoz.
5. Sebvarró selyem 3 különféle szám 1 tokban, utazásra

alkalmas.

Schering chloroform e chloralo, beforrasztott üveg phyolákban 50 és 100 gr. tart. a mely teljesen kizárja a levegő kártékony hatását a chloroformra.

Engedelmükkel még néhány szóban meg fogok emlékezni a saját tapasztalataim alapuló ujitásokról is a melyek hiszem a nagy gyakorlatban is beválnak majd. Első sorban is a chinin izének oldatokban való lehetőleg elfedésére a glycirrhizin, ammonium sóját ajánlom. A glycirrhizin az édes gyökér édes alkotó részét képezi. jó minőségű gyökérben 6—7 % foglaltatik. A gyökérből percolatio segítségével ammoniakos vízzel kivonják a mely oldatból kénsavval le csapják; a felesleges sav kimosása és ismételt kicsapása után, ammoniában lesz feloldva üveg lapra felkenve és így kiszáritva a midőn sötét vörös-barna nagy nélküli vízben oldható igen édes ízű fénylő kurzkék alakjában nyerjük. Ezen glycirrhizin ammoniacale 10 gr.-ja elegendő 1 gr. chin. muriaticum izének lehetőleg elfedésére. A mennyiben vízben igen jól oldódik, sav nélkül a chin. mur. rendelésénél igen ajánlható.

A syrolin tudvalévőleg 10% thyocolnak syr. aurantiorumban való oldata. Tekintettel arra, hogy ez egy külföldi, gyári productum igen ajánlom kartársaimnak ezen 10% thyocol oldatnak házi előállítását annál is inkább, mert olvastam Syrolin recipét külföldi szaklapokban (talán az eredeti vizsgálata után) a mely csak 5% thyocolt tartalmaz; így ha mi magunk készítjük ezen oldatot, legalább biztos lehet a rendelő orvos, hogy 10% thiocol oldatot kap a betege.

Készítek továbbá 10 czentigrammos phenolphtalein labdacsoakat is myventi glycerinivel és egy kevés p. ireos fl.-val. Ezen labdacso a szájban egész könnyen elolvadnak, mindig puhán maradnak, a kevés myr. glycerinü nagyon jól fedi a phenolphtalein kesernyész ízét, az ibolya-por pedig mindenki által kedvelt ízt ad a labdacso.

Végre saját készítésű china vas boromat mutatom be, a mely tiszta 3 puttonos tokaji asszúval készült. Ezen bor a china-kéreg összes gyógyhatásu alkotó részeit tartalmazza.

Előállításához a híres Hell-féle vegy-gyár által külön china-bor előállítására készített china-extractumát használtam és ferrum citric. am-ot. Ezt a gyógybort ezen extractum chinae pro vino chinae bemutatása végett hoztam fel. Az ily uton előállított china vas-bor óriási különbséget mutatott fel izre, gyógyhatásra nézve egyaránt más oly borokkal szemben, a melyek nem a china-kéreg ható anyagait tartalmazzák, hanem csak p o. chinin forr. citricum feloldásával készülnek.

Az előadónak értékes és tanulságos ismertetéseért és előadásáért a közgyűlés köszönetet mond.

Dr. Zehery István törvényszéki orvosi gyakorlatában sok orvosi szempontból érdekes és tanulságos esetek közül néhányat ismertett a következőkben:

Bonczolási lelet és vélemény N. N. F.-Zsaluzsányi lakos gondatlansággal vádolt emberölés vétségével bába bűnügyében.

Előzmény: X. nő V. para estefelé szülési fájdalmakat kapott s a szülésznő este 6 órakor megvizsgálta s jelentette, hogy itt igen rossz szülés lesz, olyan mint egy év előtt volt a faluban, (t. i. elhanyagolt harántfekvés, melyet műtéttel fejeztem be), de orvosért nem küld. A szülőnőnél később kifejlődik a harántul fekvő gyermek lehaladása a medenczébe s a bába ekkor (éjlél felé) orvos után javasol küldeni, de éjjel lévén, maga a férj sem iparkodik ezen.

Több tanu állítja, hogy később a bába több ízben benyult a csöbe s a férj állítása szerint egy ízben igen erősen fájta a behatolás a szülőnek, mert jajgatva kérte a szülésznőt, hogy hagyja abba műveletét. Éjféli után rövid időre (lehet, hogy azonnal) a bába említett behatolása után (mert a tanuvallomásból az időt megállapítani pontosan nem lehetett) a szülő nő hirtelen hátrahanyatlik és meghal.

A megejtett törvényszéki bonczolás teljes vérszegénységet állapít meg az összes szervekben.

A szabad hasüregben több mint $2\frac{1}{2}$ liter vér. A méhnek jobb oldalán a hüvelyboltozatra is kiterjedő s a méh alsó szakaszától fel a méh-test közepéig haladó repedés, mely az egész kezét kényelmesen befogadja, úgy hogy a repedésen át a kéz