

orvos-gyógyszerész-egylet gyűlésén a nőt bemutatom a következő lelettel: A hüvelyfalak rendesek, a méh a medenceürrben retrovertálva fekszik, prolapsusnak jele nincs. A leírt esetben a prolapsus akkép keletkezett, hogy a szülés után a méh nem fejlődött vissza, descensus mellett Retroversio uteri volt a prolapsusnak okozója.

Bemutatja a celulose méh-gyűrűket, melyekből a czél-szerű állásu pessariumok, forró vízben, átinelegítve készíthető olyan formában, a minőt a méh retroflexiója kíván.

Dr. Ruber typhosusnál a Jaksch tanár ajánlata folytán lactophenint kísérelt meg, melynek kitűnő hatásáról a következőkben referál:

A lactophenin nem egyéb, mint phenacetin, melyben az ammoniakhoz kötött eczetsav tejsav által van helyettesítve. A lactophenin gyengén keserű, nem kellemetlen ízű, vízben oldható fehér por. Javallva van minden magas láznál mint lázellenes, neuralgiáknál mint fájdalomcsillapító szer. Jaksch tanár a hasihagymáz specífiumának tartja. Állítja, hogy a lázas hőmérséketet pontosan leszállítja minden kellemetlen mellékhatás nélkül; különösen azonban igen megnyugtatólag hat a hagymázos betegre. A deliriumok eltűnnek, az öntudat szabad lesz és a betegek kivétel nélkül alanyilag jól érzik magukat, mint az semmi más kezelési módnál nem tapasztalható. A legtöbb eset, melynél a lactophenint több napon át adta, néhány nap múlva lefolytak és betegeknél kivétel nélkül éhségérzet lépett fel. Adagja 0.50—1.00 napjában többször, napi adagja 5—6 gramm.

A lactophenint egy még jelenleg is kórházi kezelés alatt levő igen súlyos hasihagymáz eseténél próbáltam meg. A 16 éves gyengébben fejlett és táplált betegnél már az első hét második felében nagy fokú erőtlenség, az öntudat teljes felfüggesztése, csendes delirium, igen gyakori önkénytelen bűdös székletek léptek fel, nyelv száraz, cserepes, ajkak berepedezettek. Láz közép magas 39° — 40° közt ingadozik. Ezen kóros tünetek a második hét elején még fokozódtak. A betegség 9. és 10-ik napján naponként 3-szor 0.50 lactophenin adagoltatott, a hideg lemosásokon kívül egyéb kezelés nélkül. Már a 2-ik napon, jóllehet a láz alig 0.5 foknyi különbséget mutatott az alanyi tünetek javultak, a 3-ik napon az öntudat nagyrészt visszatért, a delirium megszűnt, beteg a hozzáintézett kérdésekre értelmesen felel, a székletek kevésbé gyakoriak, s a mi fő, az önkénytelen székürülések teljesen elmaradtak. Hogy megtudjam, vajjon a betegségi tünetekben mutatkozó javulás a lactopheninnek tudható-e

be, annak adagolását elhagytam, s a beteg hideg lemosások mellett 1·0 chinint kapott esti órákban két adagra osztva. Pár nap múlva az előbbi súlyos alanyi tünetek léptek fel, folytonos önkénytelen büzös székletekkel. Az erőtlenség még nagyobb fokú, a beteg az ágy vége felé összeesve fekszik. Érverés perezenként 120, kiesiny, könnyen elnyomható. A harmadik hét elején ujolag lactophenin, délelőtt 0·50, délután 1·0; éjjelre 0·50 három napon át. Ezen három nap alatt a láz menete a délutáni órákban a következő: I. nap d. u. 3 óra 39₃, (1·0 lactophenin) d. u. 5 órakor hő 38₂, 7 órakor 38₅, 9 órakor 39₁. A hő leesés gyenge izzadás mellett az alanyi tünetek javulásával jelentkeznek. II-ik nap d. u. 3 órakor hő 39₅, (1·0 lactophenin) d. u. 5 órakor hő 38₁, 7 órakor 38₀, 9 órakor 37₉, kevés izzadás mellett az alanyi tünetek feltűnően javulnak, az öntudat visszatér, delirium elenyészik; széklet a nap folyamán két ízben volt, azt éjjeli edénybe üríti. III-ik nap d. u. 3 órakor hő 39₃ (0·50 lactophenin); d. u. 5 órakor hő 38₅, 7 órakor 38₅, 9 órakor 39₂, (0·50 lactophenin) éjjel 11 órakor hő 38₂, öntudat teljesen szabad, delirium nincs, széklet egy, éjjeli edényt kér. Miután a kísérletezésre kapott 10₀ lactophenin elfogyott, beteg több lactophenint nem kapott. A következő két napon a láz 38₅—39₀ fok közt ingadozik, a délutáni és éjjeli órákban időnkint csendes delirium, reggel öntudat szabad, hasmenés megszűnt.

Az előadottakból kitűnik, hogy a lactophenin legnagyobb 1·0 adagokban a lázas hőmérséketet több órán keresztül jelentékenyen leszállítja minden kellemetlen mellékhatás s nev- rázó hideg és cyanosis jelentkezése nélkül; az alanyi tüneteket más kisebb adagok is kedvezően befolyásolják, a közérzet javul, az öntudat visszatér, delirium elmarad. Feltűnő volt a lactopheninnek a székürülésekre való hatása, a mennyiben az első két napos kísérlet alkalmával is a székletek kevesbbedtek, az önkénytelen székürülések ideiglenesen elmaradtak; a 2-ik három napos kísérlet alkalmával pedig a hasmenés teljesen megszűnt. Ezen feltűnő kedvező hatást a lactopheninben foglalt phenol és tejsav együttes hatásának tulajdonítom, mint a melyek a belekben végbemenő fekélyesedéseket és erjedést kedvezően befolyásolják.

Bár ezen egy esetben és akkor is csak pár napra terjedő kísérletet nem tartom teljesen bizonyító erejűnek, a kísérletezés alkalmával észlelt kedvező tüneteket elégségeseknek tartom arra, hogy a szer súlyos hasi hagymáz eset alkalmából megpróbáltassék, s mint ilyent a t. Kartárs urak figyelmébe ajánlom.